

DIPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS.

10^e PARTIE (1) (*Pars secunda*)

Par M. J.-M.-F. BIGOT.

XV (suite).

Tribu des ASILIDI

CURIES DES **Laphridæ** ET **Dasypogonidæ**.

(Séance du 14 Juin 1876.)

CURIE DES **Dasypogonidées** (*Dasypogonidæ* J. B.).

Genre MICROSTYLUM (Macq. et Schiner).

1. M. AMOYENSE, ♂. — Long. 4 cent.

Cinereum, incisuris abdominis pedibusque nigris. Antennis et haustello nigris; facie, mystace barbâque cinereo pallido; thoracis disco vittis quatuor lateralibus, abbreviatis, latis, ad suturas interruptis, cinereo fusco;

(1) Voir pour la 1^{re} partie : n° I, Annales 1874, p. 107 ; n° II, p. 116 ; 2^e partie, n° III, p. 235 ; 3^e partie, n° IV, p. 454 ; 4^e partie, n° V, Annales 1875, p. 237, et 5^e partie, n° VI, p. 469, et n° VII, p. 483 ; 6^e partie, n° VIII, Annales 1876, p. 389 ; 7^e partie, n° IX, Annales 1877, p. 35 ; 8^e partie, nos X et XI, Annales 1877, p. 243 ; 9^e partie, nos XII, XIII ; XIV, Annales 1878, p. 31, et 10^e partie, n° XV (*pars prima*), Annales 1878, p. 213.

(1878)

1^{re} partie, 26.

scutello cinereo ; macrochætis nigris ; halteribus , pulvillis , testaceis ; pedibus nigris, tibiis anterioribus externè castaneis, macrochætis nigris, tarsis nigris ; alis ferè hyalinis, extrinsecus parum obscurioribus.

D'un gris pâle ; antennes et trompe noires, face blanchâtre, ainsi que plusieurs macrochètes au bord supérieur de l'épistome, barbe courte et rare, blanchâtre ; quelques macrochètes noirs de chaque côté du front et d'autres semblables, disposés en collerette derrière et autour des orbites ; disque thoracique avec quatre larges bandes longitudinales, d'un gris brunâtre, intermédiaires fort rétrécies en arrière, latérales n'atteignant pas le bord antérieur, interrompues aux sutures ; écusson d'un gris foncé ; balanciers testacés ; abdomen d'un gris pâle, avec reflets noirâtres vers l'extrémité, les deux premiers segments avec une macule oblongue, transversale, à la base, tous les segments étroitement liserés de noir à la base, cette couleur disparaît sur les côtés ; organes ♂ d'un noir luisant ; hanches grises, à soies noires et villosités blanchâtres, tibias antérieurs un peu brunâtres extérieurement, tibias et cuisses avec quelques soies noires, macrochètes des tibias blanchâtres, ceux des tarses noirs, sauf quelques-uns, situés à la base du premier article, pelotes testacées, ongles noirs ; ailes d'un gris très-pâle, plus foncé au bord externe et à la base, nervures noires, bordées de gris pâle.

Amoy. — Ma collection.

2. M. ERYTROPYGUM, ♂. — Long. 20 mill.

M. basirufi vicinum (detritum). Nigro fusco, exceptis : facie cinereâ, mystace barbâque pallidè cinereis ; pleuris cinereo maculatis ; genitilibus ♂, rubidis ; halteribus testaceis ; trochanteribus cinereo longè villosis ; femoribus fulvis, geniculis tibiisque nigris, macrochætis nigris ; pulvillis testaceis ; basi abdominis subtus cinereo pilosâ ; alis fuscis.

Voisin du *M. basirufum* (fort détérioré). D'un noir brun, ailes d'un noirâtre luisant, organe ♂, d'un rouge orangé : face grisâtre ; antennes noires ; rostre brun à l'extrémité ; face, moustache et barbe grisâtres ; côtés du thorax gris, flancs maculés de gris, quelques poils gris et macrochètes noirs ; balanciers testacés ; abdomen à reflets grisâtres, avec des poils gris,

en dessous, de chaque côté; hanches noires, les antérieures couvertes de longs poils gris; pieds fauves, trochanters, genoux, extrémités des tibias et tarses noirs, macrochètes noirs; pelotes testacées.

Assam. — Ma collection.

3. *M. BASIRUFUM*, ♂. — Long. 20 mill.

Obscurè fuscum, abdomine basi latè fulvo: antennis nigris; facie cinereo, mystace nigro, barbâ fulvâ; pedibus fulvis, geniculis tarsisque nigris; alis pallidè castaneis; halteribus testaceis.

D'un noir brunâtre foncé, abdomen avec les trois premiers segments fauves, les autres d'un noir luisant; antennes et rostre noirs, palpes noirs, à poils noirs; face grise, moustache très-peu fournie, noire, barbe fauve; thorax (*dénudé*) d'un noir brun, ainsi que l'écusson, épaules, côtés et flancs, grisâtres, avec des macrochètes noirs; balanciers testacés; un peu de brun, sur les côtés des segments, fauves, de l'abdomen; hanches grisâtres, les antérieures avec des soies rigides, noires; cuisses fauves, trochanters noirs, genoux noirs, tibias fauves avec l'extrémité noire, tarses noirs, macrochètes noirs, pelotes testacées; ailes brunâtres, nervures d'un brun rougeâtre.

Assam. — Ma collection.

4. *M. BREVPENNATUM*, ♂. — Long. 22 mill.

Undique cinereo nigro, alis latis, non elongatis, nigris, apice pallidioribus; abdomine cinereo pallido, incisuris nigris.

D'un noir grisâtre foncé, face plus pâle, barbe grisâtre, flancs d'un gris assez obscur; abdomen, les quatre premiers segments d'un gris plus pâle, un peu de noirâtre à la base et aux incisions; pelotes fauves, balanciers d'un brun rougeâtre; ailes assez larges, notablement plus courtes que l'abdomen, noirâtres, avec le tiers postérieur gris.

Indiæ orient. — Ma collection.

5. *M. EXIMIUM*, ♂. — Long. 15 mill.

Thorace nigro, abdomine rubido fulvo, alis nigris, iridicoloribus; antennis nigris, facie cinereo nigro, mystace nigro, barbâ albidâ; halteribus testaccis; femoribus tibiisque testaceis, extrinsecus nigro fusco, geniculis tarsisque nigris, pulvillis testaceis.

Thorax noir, côtés à reflets gris, épaules brunes, abdomen d'un fauve rougeâtre, muni en dessous, sur les côtés, de long poils jaunes : antennes et face noires, à reflets gris ; palpes noirs, à poils noirs, barbe blanche ; rostre noir, avec l'extrémité fauve ; poils, derrière la tête, d'un gris noirâtre en dessus, blanchâtres en dessous ; écusson d'un noir grisâtre ; flancs noirs, à longs poils blancs ; balanciers testacés ; quelques macrochètes, en arrière du thorax, noirs ; hanches noires, antérieures à longs poils blancs ; cuisses testacées, brunes en dessus et en dedans, ainsi qu'à la base et aux genoux, tibias de mêmes nuances, postérieurs plus foncés, tarsi noirs, pelotes fauves, macrochètes noirs ; ailes noirâtres, avec de brillants reflets d'un bronzé verdâtre.

Birmanie. — Ma collection.

6. *M. HÆMORRHOÏDALE*, ♂. — Long. 13 mill.

M. eximii vicinum. Nigrum, genitalibus ♂, fulvis, alis nigris, iridicoloribus : antennis, basi, nigris; facie cinereo nigro, mystace nigro; barbâ albidâ; femoribus fuscis, tibiis testaceis, posticis castaneis; halteribus albido flavido; pulvillis testaceis.

Voisin du *M. eximium*. Noir, organe ♂ orangé, ailes noires, à reflets violacés ; antennes à base noire (*le reste manque*), face noirâtre, à reflets gris ; palpes noirs, à poils noirs ; rostre à pointe fauve ; moustache noire ; barbe blanchâtre, poils, derrière la tête, noirâtres en dessus, gris en dessous ; thorax noir, de chaque côté, une large bande de reflets gris au-dessus des ailes, épaules un peu testacées, écusson noir à reflets blanchâtres, flancs noirs, à longs poils blancs ; hanches noirâtres, à poils

blancs; abdomen d'un noir un peu brunâtre sur les côtés, principalement la base, où se trouvent aussi de longs poils blanchâtres; balanciers d'un blanc testacé; quelques macrochètes noirs en arrière; cuisses noirâtres, un peu brunâtres en dehors, tibias antérieurs et intermédiaires d'un testacé pâle, bruns en dehors et vers l'extrémité, postérieurs brunâtres, plus foncés extérieurement, tarses d'un noir brunâtre et pelotes testacés, macrochètes noirs.

Birmaniam. — Ma collection.

7. *M. NITIDIVENTRIS*, ♀. — Long. 19 mill.

M. nigri vicinum. Undique nigrum, abdomine nitido : thorace, utrinque, parum cinereo; antennis basi nigris; haustello apice rufo; barbâ rufo obscuro; tibiis obscurè castaneis; genitalibus ♀, fulvo villosis; alis nigris, iridicoloribus; halteribus et pulvillis fulvis.

Voisin du *M. nigrum*. Entièrement noir, abdomen fort luisant; antennes à base noire (*le reste manque*); extrémité du rostre rougeâtre; barbe courte, roussâtre; côtés du thorax et flancs avec quelques reflets d'un gris obscur; tibias d'un brun rougeâtre obscur; balanciers et pelotes testacés; ailes noirâtres, à reflets violets et bronzés.

Birmaniam. — Ma collection.

8. *M. NIGRUM*, ♀. — Long. 26 mill.

Undique nigrum, exceptis : abdomine, nitente, facie, mystace, subtus barbâque albidis; pleuris albido micantibus; alis obscurè fuscis; halteribus pallidè testaceis.

Noir, abdomen luisant; occiput un peu roussâtre sur les côtés, face blanchâtre, moustache, en dessous, blanche, barbe blanche; poils au-dessous du col, ceux des hanches, ceux enfin qui existent, assez clairsemés et allongés, en dedans, à la base de l'abdomen, blancs; quelques macrochètes noirs sur les côtés du thorax, lesquels, de même que le bord postérieur, les flancs et les hanches, présentent des reflets blancs; balan-

ciers et pelotes d'un testacé pâle ; ailes noirâtres, plus claires à la base, ainsi qu'aux bords internes et postérieurs.

Cambogium. — Ma collection.

9. M. VILLOSUM, ♂. — Long. 21 mill.

Obscurè fuscum, undique griseo longe aut breviter, villosum. Antennis ?... Mystace barbâque cinereis, callis humeralibus fulvis ; halteribus testaceis ; pedibus fulvis, femoribus et tibiis posticis, extrinsecus, nigris ; alis ferè hyalinis, geniculis fulvis.

D'un brun foncé : antennes ? (*manquënt*) ; moustache et barbe allongées, épaisses et grises, palpes noirs, avec de longs poils gris, rostre noir, derrière de la tête garni de poils épais, gris ; thorax noirâtre, couvert d'un duvet grisâtre, quelques macrochètes, noirs en arrière, blanchâtres sur les côtés du disque, épaules fauves, flancs gris, à poils gris ; abdomen gris, couvert de duvet gris, avec de longs poils blanchâtres en dessous ; organe ♂, fauve, avec les forceps noirs à leur extrémité ; balanciers testacés ; pieds, munis de longs poils gris assez épais, entièrement fauves, sauf une bande au dos des cuisses ainsi que l'extrémité des crochets, qui sont noirs, tibias postérieurs un peu brunâtres en arrière, hanches fauves, à longs poils gris, les postérieurs avec une macule brune ; ailes presque hyalines, nervures testacées à la base ainsi qu'au bord externe.

Cap. B. Sp. — Ma collection.

10. M. SAGITTA, ♂. — Long. 4 centim.

Elongatum, cinereo pallido ; antennis et haustello apice fulvidis, facie, mystace, barbâque cinereis ; thorace vittis duo fuscis, callis humeralibus obscurè fulvis, halteribus ejusdem coloris, sicut et abdominis incisuræ ; femoribus rubidis, anterioribus intermediisque supernè fuscis, tibiis nigris, macrochartis albis, pulvillis testaceis ; alis ferè hyalinis, venis basi testaceis et pallide testaceo limbatis.

Formes grêles, allongées. Grisâtre ; antennes brunes, troisième article

largement rougeâtre vers son milieu, palpes noirs, à poils blanchâtres, rostre noir, à pointe roussâtre, face, moustache, barbe, poils derrière la tête, gris; thorax, écusson, noirâtres, à reflets gris, côtés plus clairs, deux bandes brunâtres, épaules un peu roussâtres, flancs d'un gris pâle, macrochètes blanchâtres; balanciers d'un testacé obscur; hanches grises, avec des poils blanchâtres, courts; cuisses rougeâtres, antérieures et intermédiaires brunes en dessus, tibias et tarses noirâtres, les premiers, ainsi que les articles des tarses, à base rougeâtre, pelotes testacées, macrochètes des tibias et des tarses blancs; abdomen gris, couvert de duvet plus pâle, segments liserés de roussâtre; organe ♂, noir; ailes d'un gris très-clair, nervures brunes, fauves à la base et sur le bord extérieur, toutes bordées d'un peu de roussâtre pâle.

Natal. — Ma collection.

11. *M. VARIPENNATUM*, ♂. — Long. 25 mill.

Nigro-fusco, tibiis tarsisque testaceis. Antennis? Mystace denso, cinereo, barbâ tongâ, albidâ; thorace cinereo obscuro villosulo, macrochaetis albidis, pleuris pallide cinereis; halteribus fulvis; scutello cinereo; abdomine nigro, utrinque cinerascete, incisuris obscure fulvis; femoribus fuscis, inferne fulvis, tibiis tarsisque pallide fulvis, onichyis nigris, basi testaceis, macrochaetis testaceis; alis hyalinis, cellulis, basali externâ exceptâ, latè cinereo maculatis, marginibus, intus, hyalinis.

D'un noir brunâtre. Face et moustache d'un gris jaunâtre, celle-ci épaisse et longue, ainsi que la barbe, qui est blanchâtre, front gris, à poils gris; thorax d'un gris noirâtre, à reflets jaunâtres, plus clairs sur les flancs, côtés avec villosité et macrochètes d'un blanc grisâtre; écusson gris; balanciers d'un fauve obscur; abdomen noirâtre, avec reflets latéraux d'un gris jaunâtre et bords postérieurs des segments liserés de rougeâtre; pieds d'un testacé fauve, cuisses largement brunâtres en dessus, extrémités des tibias et des tarses postérieurs de mêmes nuances, les macrochètes blanchâtres, pelotes testacées, ainsi que la base des ongles; ailes assez claires, surtout aux bords internes et postérieurs, toutes les cellules largement teintées de gris en leur milieu, *sauv la basilaire externe.*

Cap. B. Sp. — Ma collection.

12. *M. CAPECINUM*, ♂, ♀. — Long. 4 centim.

Fusco nigro, cinereo villosum : facie, mystace, barbâ, halteribus, pleurarum maculâ latâ, genitalibus pedibusque, fulvo-castaneo; pulvillis fulvis.

♂. D'un brun noirâtre, antennes et rostre, noirs; palpes noirs, à poils noirs; face, moustache, barbe, les poils derrière la tête, d'un gris jaunâtre, occiput à poils noirs; thorax, écusson, noirâtres, à villosité grise, quelques macrochètes noirs aux épaules, sur les côtés du disque, en arrière et sur l'écusson, blanchâtres, flancs avec une large macule, d'un fauve rougeâtre et lisse, au-dessous de l'insertion des ailes; balanciers testacés; abdomen couvert d'un duvet, ou plutôt, d'une sorte de *pulvéulence* jaunâtre, ventre à poils gris; organe ♂, d'un fauve rougeâtre; hanches noirâtres, à poils gris; pieds d'un fauve rougeâtre, épines, macrochètes, genoux, extrémité des tarsi, noirâtres, pelotes fauves; ailes d'un brun noirâtre, nervures, base et bord externe, roussâtres, les nervures bordées d'une nuance plus claire.

Un individu ♀, de même provenance, me paraît appartenir à la même espèce; il ne diffère du précédent que par la taille un peu moindre, son abdomen plus foncé ou presque noir vers l'extrémité, enfin, la tache des flancs est plus obscure.

Cap. de B. Sp. — Ma collection.

13. *M. NIGRIBARBATUM*, ♂. — Long. 25 mill.

Nigrum; alis testaceis; facie albâ, barbâ nigrâ, mystace albido; pulvillis pallide testaceis; halteribus obscuris; macrochætis undique nigris; alis fuscis, venis fulvis.

Entièrement noir, abdomen assez luisant; tous les poils et tous les macrochètes noirs ou noirâtres; balanciers bruns; pelotes d'un testacé pâle; face blanche, moustache d'un blanc un peu jaunâtre, barbe noire; ailes d'un brun noirâtre, nervures fauves.

Natal. — Ma collection.

14. M. ELONGATUM, ♂. — Long. 26 mill.

Fuscum : antennis basi nigris, haustello nigro, facie, mystace, barbâque pallidè cinereis ; thorace pallidissime vittato, pleuris, scutello, trochantaribus, abdomine, lateribus pallidè cinereis, incisuris et apicè angustè fulvo ; halteribus et pulvillis testaceis ; pedibus fuscis, femoribus, infernè, fulvis, macrochætis tibiæ albidis ; alis pallidè cinereis, venis testaceis.

D'un brun noirâtre : antennes à base noire (*le reste manque*) ; face, moustache, barbe, poils derrière la tête, d'un gris blanchâtre ; thorax avec des bandes longitudinales obscures, peu distinctes ; côtés, flancs, écusson, à reflets d'un gris blanchâtre, macrochètes blanchâtres ; balanciers testacés ; abdomen noirâtre, côtés à reflets grisâtres, extrémité munie de poils et bords extrêmes des segments, fauves ; hanches grises, à poils gris ; pieds bruns, cuisses largement fauves en dessous, pelotes testacées, macrochètes des tibias blanchâtres ; ailes presque hyalines, très-légèrement teintées de roussâtre à l'extrémité ainsi qu'à la base, nervures testacées.

Natal. — Ma collection.

15. M. FULVICAUDATUM, ♀. — Long. 17 mill.

Fuscum, abdomine apice latè fulvo : alis obscurè fuscis, basi ferè hyalinis ; antennis nigris ; facie cinereo flavido, mystace nigro, barbâ pallidè flavâ ; pedibus fusco livido ; halteribus testaceis.

D'un brun noirâtre foncé : antennes noires ; rostre brun à l'extrémité, palpes noirs, à poils noirs, face jaunâtre, moustache très-peu fournie, noire, barbe jaunâtre, ainsi que les poils derrière la tête ; bords du thorax et base de l'écusson bruns, flancs grisâtres, macrochètes noirs ; balanciers testacés ; abdomen à reflets gris sur les côtés, les quatre derniers segments d'un fauve luisant à bords noirs ; hanches d'un gris noirâtre, antérieures à longues soies noires ; pieds d'un brun livide, base des cuisses

un peu pâle, macrochètes noirs ; pelotes brunâtres ; ailes noirâtres, à base presque hyaline.

Natal. — Ma collection.

16. *M. FULVIGASTER*, ♂. — Long. 28 mill.

Nigro-fusco, abdomine fulvo : mystace barbâque pallidè testaceis ; pleuris obscurè cincreis, halteribus et pulvillis obscurè testaceis ; abdomine fulvo rubido ; alis fuscis.

Entièrement d'un brun noirâtre foncé, excepté : moustache et barbe d'un blanc testacé clair ; flancs à reflets gris ; balanciers d'un testacé obscur ; abdomen entièrement d'un fauve rougeâtre foncé, de même que les villosités et les macrochètes qui s'y trouvent ; hanches et pieds à villosité d'un gris jaunâtre, macrochètes des cuisses et des tibias blanchâtres ; ailes d'un brun noirâtre assez foncé.

Mexicus. — Ma collection.

Genre *DASYPOGON* (Loew, Schin., etc.).

1. *D. PEKINENSE*, ♂, ♀. — Long. 16 mill.

Nigro fulvoque pictum : antennis fulvis, mystace barbâque albido flavido ; thorace vittis duabus, pleuris scutelloque cinereo flavido pruinoso ; ♂, abdomine fulvo, basi, cingulis duo nigris ; ♀, nigro, basi et apice obscurè fulvo, utrinque, maculis tribus pallidè auratis ; pedibus fulvis ; alis pallidissimè testaceis.

Noirâtre varié de fauve : antennes fauves, style noirâtre ; face d'un gris foncé, ♂ ; jaune, ♀ ; palpes et rostre noirs, à poils noirs, moustache d'un gris jaunâtre, poils derrière la tête noirs ; thorax d'un noir opaque, avec quatre bandes, fort peu distinctes, grisâtres, sur le disque ; ♂, les deux intermédiaires fort étroites et presque contiguës ; ♀, bien distinctes, d'un gris jaunâtre, principalement sur les côtés ; écusson à reflets gris, flancs

à reflets dorés pâles ; balanciers testacés, macrochètes noirs ; abdomen fauve ; ♂, base et deux larges anneaux situés au milieu des 4^e et 5^e segments, d'un noir brun, deux macules allongées brunâtres, situées de chaque côté, à la base des segments, fauves ; ♀, noir, base des segments en dessus, d'un fauve roussâtre, plus clair sur les 2^e et 3^e, 6^e et suivants fauves, une macule triangulaire, d'une couleur dorée pâle, de chaque côté des 3^e, 4^e et 5^e ; hanches noires, à reflets dorés ; pieds fauves ; ♂, une bande brune à la partie interne des cuisses postérieures, macrochètes noirs ; ailes d'un testacé très-pâle, plus foncé à la base et le long du bord externe.

China boreal. — Ma collection.

2. D. JAPONICUM, ♀. — Long. 23 mill.

Fuscum : antennis pedibusque fulvis, mystace barbâque flavidis ; pleuris scutelloque fulvo rubido ; abdomine basi, obscure fulvo rubido ; alis palidè testaceis, apice anguste fusco limbatis.

D'un noir brun : antennes fauves, style à pointe brune, rostre et palpes noirs, à poils jaunes ; face noire, moustache et barbe d'un jaune doré, poils derrière la tête un peu brunâtres en haut, entremêlés de macrochètes noirs ; thorax (*dénudé*), bords, épaules, base des ailes en dessous, écusson, rougeâtres, flancs noirs, en arrière quelques macrochètes noirs ; balanciers rougeâtres ; abdomen noir, les deux derniers segments rougeâtres, un peu de rougeâtre obscur, vers le milieu de la base des 2^e, 3^e et 4^e segments ; hanches rougeâtres, noirâtres à la base ainsi qu'à l'extrémité, les antérieures à longs poils dorés ; pieds fauves, genoux teintés de brun, macrochètes courts, noirs ; ailes un peu jaunâtres, nervures d'un fauve pâle, plus foncé à la base et au bord externe, légèrement bordées de brunâtre, surtout à l'extrémité ainsi que sur les nervures transversales.

Japon. — Ma collection.

3. D. BILIMBATUM, ♀. — Long. 16 mill.

Obscurè rufum, pedibus fulvis : antennis fulvis, apice fuscis ; facie, mys-

tace barbâque aurulentis; thorace fusco latè notato; abdomine nitido, limbo, utrinque, et incisuris, nigris; halteribus testaceis; tibiis fulvis; alis pallidè testaceis, iridicoribus.

D'un fauve rougeâtre foncé : antennes fauves, style brun, palpes bruns, à poils dorés, rostre noirâtre, à pointe fauve ; face dorée, moustache et barbe de même couleur ; thorax, écusson, d'un fauve obscur, le premier, en avant, avec une macule allongée triangulaire, deux autres, à peu près carrées, de chaque côté, une dernière, assez arrondie, au bord postérieur, brunes, flancs à larges macules de reflets gris jaunâtre ; balanciers testacés ; abdomen luisant, d'un fauve obscur, segments finement bordés de brun, une ligne étroite, noirâtre, de chaque côté, sur toute la longueur de l'abdomen ; hanches brunes ; pieds entièrement fauves, une courte bande, peu distincte, brunâtre, en dessus, vers l'extrémité des cuisses, macrochètes et pelotes fauves ; ailes d'un testacé assez pâle, avec des reflets violacés, surtout aux bords internes et postérieurs.

California. — Ma collection.

4. D. QUADRINOTATUM, ♂, ♀. — Long. ♂ 11 mill.; ♀ 13 mill.

Flavido et testaceo pictum: antennis fulvis; mystace et barbâ flavidis; thorace flavido, lineis duabus, maculisque quatuor, nigris; abdomine fulvo; pedibus fulvis; ♂ femoribus, extrinsecus, maculâ lineari fuscâ; alis testaceis.

Thorax jaunâtre, abdomen fauve : antennes et palpes fauves, à poils jaunes ; face jaune, moustache, barbe, poils derrière la tête, jaunes ; thorax, écusson, d'un jaune pulvérulent, sauf deux bandes étroites et quatre petites macules, lisses et noires, sur le disque ; abdomen, premier segment d'un jaune pulvérulent, les autres lisses ; balanciers, poils et macrochètes, d'un testacé fauve ; hanches postérieures, avec une macule, cuisses, ♂, avec une bande étroite et courte sur le côté extérieur, noirâtres ; ailes testacées, plus foncées aux nervures et le long du bord externe.

California. — Ma collection.

Genre SAROPOGON (Loew, Schin.).

1. S. SCALARE, ♀. — Long. 12 mill.

Nigro rufoque pictum : antennis fulvis ; mystace albedo, barbâ pallidè fulvâ ; thorace rufo, disco nigro, quinque annulato ; halteribus, pedibus, alis, testaceis.

D'un rougeâtre foncé : antennes fauves, palpes à poils fauves ; face noire, jaunâtre sur les côtés et au-dessous des antennes ; moustache d'un blanc jaunâtre, barbe et poils derrière la tête, testacés ; thorax, écusson, rougeâtres, une large macule orbiculaire terminée en avant par une ligne étroite et flancs, d'un noir brunâtre ; balanciers jaunâtres ; en arrière du thorax quelques macrochètes fauves ; abdomen, très-finement ponctué, rougeâtre, avec cinq larges bandes transversales noires, situées à la base des cinq premiers segments ; hanches noirâtres, antérieures à longs poils blanchâtres ; pieds entièrement fauves, une petite bande brune au côté externe des cuisses postérieures, macrochètes courts, noirs ; ailes d'un testacé clair, plus prononcé aux bords internes et postérieurs.

Indiæ orient. — Ma collection.

2. S. HYACINTHINUM, ♀. — Long. 11 mill.

Nigrum, abdomine hyacintho nitente picto, tibiis pallidè flavis, femoribus castaneis, tarsis nigris : facie cinereo albedo, mystace nigro, barbâ albidâ ; halteribus testaceis ; alis ferè hyalinis, nervis fuscis.

D'un noir opaque, abdomen d'un beau violet brillant : antennes à base noire (*le reste manque*) ; rostre et palpes noirs, à poils noirs ; face d'un blanc grisâtre, moustache noire, barbe blanche, poils derrière la tête noirâtres ; thorax, écusson, d'un noir opaque à villosité grise, macrochètes noirs, flancs luisants ; balanciers testacés ; hanches noires à poils blanchâtres ; cuisses brunes, tibias d'un testacé jaunâtre, avec l'extrémité brune, tarses noirâtres, macrochètes noirs ; ailes un peu grisâtres, nervures brunes.

Chili. — Ma collection.

3. *S. NIGRONASUTUM*, ♂. — Long. 13 mill.

Atrum, pedibus testaceis : antennis, palpis et rostro nigris ; facie et mystace albidis, barbâ nigrâ ; thorace utrinque albedo, angulis testaceis ; scutello cinereo ; abdomine incisuris, utrinque, albidis ; halteribus fulvis, apice fuscis ; alis cinereis, basi, extrinsecus fuscis.

D'un noir opaque, pieds entièrement fauves : antennes, palpes, barbe, poils, derrière la tête, noirs, face d'un blanc un peu jaunâtre, moustache blanche ; thorax avec une bande de reflets blanchâtres de chaque côté du disque ; écusson à reflets gris ; balanciers fauves à massue brune, quelques macrochètes noirs en arrière ; abdomen noir, segments bordés de fauve obscur, une bande transversale, peu distincte, rougeâtre, vers le milieu du 4^e, les 2^e, 3^e et 4^e, de chaque côté, liserés de blanc argenté ; hanches, macrochètes des tibias et des tarses, noirs, pelottes d'un blanc jaunâtre ; ailes grises, base testacée, une large macule diffuse vers le milieu du bord externe.

Chili. — Ma collection.

4. *S. FRATERNUM*, ♂, ♀. — Long. ♂ 13 mill. ; ♀ 16 mill.

Nigrum, facie, utrinque, obscure argenteâ, pedibus fulvis, nigro variegatis, tarsis nigris : alis nigris, iridicoloribus, intus et apice cinereis ; halteribus ferè albis, ♂ ; testaceis, ♀.

D'un noir profond, pieds fauves : côtés de la face et bords orbitaires d'un blanc argenté ; ♂, balanciers d'un blanc jaunâtre ; ♀, testacés ; hanches velues ; cuisses noires à l'extrémité, les antérieures d'un brun foncé, sauf une tache fauve, en dessous, près de l'extrémité, tibias avec l'extrémité et les macrochètes noirs, tarses noirs, pelotes testacées ; ailes presque noires, surtout le long des nervures, avec reflets violacés, bords internes et postérieurs grisâtres : ♀, de taille plus grande et plus robuste.

Chili. — Ma collection.

5. *S. SEMIRUFUM*, ♀. — Long. 12 mill.

Nigrum, facie pallidè flavâ, nigro vittatâ : antennis, humeris, pleuris,

scutello, abdomine, utrinque et apice, pedibusque rufis; mystace et barbâ albidis; alis pallidissime fuscis; halteribus flavis.

D'un noir opaque : antennes fauves, style brunâtre, palpes fauves, à poils bruns, face d'un gris un peu jaunâtre, base des antennes un peu fauve, une large bande, d'un noir brillant, sur le milieu de la face, rostre noir, moustache et barbe très-peu fournies, blanchâtres, quelques poils courts, brunâtres vers le haut, derrière la tête ; thorax d'un noir brun, disque entouré de quelques reflets grisâtres, les bords, les épaules, les flancs et l'écusson, rougeâtres ; balanciers d'un jaune clair ; abdomen d'un noir brun très-foncé, finement ponctué, côtés, bords du dernier segment, ainsi que le dernier tout entier, rougeâtres, ventre gris ; pieds rougeâtres, base des hanches, extrémité des tarsi, noirâtres, tibias postérieurs garnis intérieurement de poils blancs assez épais, macrochètes bruns ; ailes d'un testacé pâle, plus foncées au bord externe, nervures brunes.

Australia. — Ma collection.

Genre DIOGMITES (Schiner).

1. D. ATRATUS, ♂. — Long. 17 mill.

Niger : incisuris antennarum, fulvis, facie inferne, barbâ et mystace albidis, macrochetis nigris setis albidis intermixtis; halteribus testaceis; pulvillis ferè albis; abdomine, basi et apice, albido parçè pilosis; alis nigris, iridicoloribus; femoribus obscurè castaneis.

Entièrement d'un noir profond, excepté : antennes fauves à la base des articles, face, au-dessous de celles-ci, blanche, moustache et barbe de même couleur, quelques macrochètes noirs mêlés, en dessus, aux soies blanches de la première ; balanciers testacés ; cuisses d'un châtain foncé, pelotes blanchâtres ; quelques longs poils gris clairsemés à la base et à l'extrémité de l'abdomen ; ailes presque noires, à reflets violacés, principalement vers la base et le long du bord externe.

Brazil. — Ma collection.

2. D. RUFIBASIS, ♀. — Long. 17 mill.

Niger, pedibus testaceis : antennis castaneis, apice fuscis, facie subtilis cinerascens, palpis nigro pilosis, mystace nigro, barbâ flavidâ, macrochætis orbitum nigris ; thorace vittis tribus pallidis, angulis, humeris, scutelli margine, fulvis, pleuris aureo pallido notatis ; abdominis incisuris testaceis, segmento secundo vittâ transversali, latâ, basilari, rubescente ; alis extrinsecus testaceis, intus et apicè cinereis.

Noir, pieds testacés : antennes brunes, base des articles rougeâtres, palpes à poils noirs, face grisâtre au-dessous des antennes, moustache noire, barbe dorée, une crête de soies rigides, noires, garnissant le bord postérieur des orbites ; thorax avec trois lignes grises n'atteignant pas le bord postérieur, les latérales courbées en dehors vers les épaules, ces dernières, ainsi que les angles postérieurs et le bord de l'écusson, d'un fauve rougeâtre, flancs à larges macules d'une nuance dorée, pâle ; balanciers fauves ; segments de l'abdomen finement bordés de testacé, une large bande transversale, rougeâtre, à la base du 2^e ; hanches grisâtres, à longs poils dorés ; macrochètes des tibias et des tarses noirs, pelotes blanchâtres ; ailes et nervures un peu fauves à la base et le long du bord externe, grisâtres aux bords internes et postérieurs, ainsi qu'à l'extrémité.

Brazil. — Ma collection.

3. D. ? NOTATUS, ♂. — Long. 16 mill.

Flavido testaceo, nigro variegato : antennis basi fulvis, palpis flavido villosis, facie albidâ, mystace et barbâ sparsis, albidis ; disco thoracico nigro ; abdominis segmentis, 1^o, cingulis duobus, 2^o, 3^o et 4^o, punctis duo incisurisque, 5^o maculis geminis latis, 6^o et 7^o, et basi latè, nigro fusco ; genitalibus ♂ fulvis : tibiis anterioribus et intermediis supernè, tarsisque, castaneis, tarsis posticis, apice, nigris ; alis ferè hyalinis.

Le défaut d'antennes m'oblige à ne rapporter que dubitativement cet insecte au genre *Diognites* ?

D'un testacé fauve : antennes à base fauve (*le reste manque*), soies des palpes jaunâtres, face blanche, moustache et barbe, très-courtes et très-

peu fournies, blanches ; thorax avec une large macule discoïdale arrondie, d'un noir luisant, bords postérieurs, écusson, à reflets dorés pulvérulents, balanciers fauves ; abdomen d'un jaune fauve, premier segment orné de deux petites bandes transversales, presque contiguës, 2^e, 3^e et 4^e avec deux macules rondes latérales et les marges, 5^e, avec deux larges macules oblongues géménées, 6^e et 7^e, enfin la base très-largement, d'un noir brun, organe ♂ d'un fauve luisant ; hanches et pieds testacés, antérieurs, genoux et tibias brunâtres, tarses d'un noirâtre foncé à l'extrémité des articles, intermédiaires, cuisses en dessus avec une bande interrompue au milieu, noirâtre, tibias et tarses semblables aux précédents, postérieurs, cuisses avec une macule noirâtre en dessus près des genoux, tarses à base rougeâtre, macrochètes blanchâtres, pelotes testacées ; ailes presque hyalines, avec une légère teinte jaunâtre, nervures brunes.

Amazonia. — Ma collection.

Genre LAPARUS (Loew, Schiner).

L. ? PICTITARSIS, ♀. — Long. 12 mill.

Nigro flavoque pictus : antennis palpisque nigris, mystace et facie auratis, barbâ pallide flavâ ; thorace flavido, vittis duo maculisque quatuor et retrorsum, fuscis ; halteribus testaceis ; abdomine flavo, segmentis, basi, nigro nitido limbâtis ; pedibus fulvis, segmentis tarsorum et tibiis posticis, apicè nigris ; alis pallide flavidis.

Varié de jaune et de noir : antennes et palpes noirs, moustache et face d'un jaune doré, barbe d'un blanc jaunâtre ; thorax d'un jaune opaque, avec deux bandes médianes et quatre grandes macules carrées, en arrière, noirâtres ; balanciers testacés ; abdomen d'un jaune mat, base de tous les segments avec une bande transversale d'un noir luisant, échancrée au milieu, dernière division d'un châtain luisant ; hanches d'un jaune mat, articulations d'un noir luisant, extrémité de tous les articles des tarses, ainsi que celles des tibias postérieurs, noires ; macrochètes fauves ; extrémité des tibias antérieurs, avec un éperon à peu près droit et noir intérieurement ; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

California. — Ma collection.

(1878)

1^{re} partie, 27.

Je rapporte, avec quelques doutes, la présente espèce au genre *Laparus*, et cette hésitation provient du vague fâcheux qui règne dans les diagnoses génériques publiées par les auteurs (Loew, Schiner).

Genre ALLOPOGON (Loew, Schiner).

A. GRACILE, ♀. — Long. 15 mill.

Cinereo nigroque pictum, alis hyalinis : antennis fulvis, segmentorum basi fuscâ, palpis fulvis nigro setosis, facie, mystace barbâque pallidè cinereis ; thorace vittis quinque nigris, utrinque et pleuris pallidè fulvo ; abdomine cinereo, segmentorum maculis subtrigonis supernè nigris, apice fulvo, halteribus testaceis ; pedibus obscurè testaceis, fusco variegatis.

Grisâtre : antennes fauves, base des segments brune, palpes fauves, à poils noirs, face, moustache, barbe, poils derrière la tête, d'un blanc grisâtre ; thorax gris, avec cinq bandes noires n'atteignant pas le bord postérieur, les latérales élargies, interrompues à la suture, épaules, côtés, d'un roussâtre pâle, flancs testacés à reflets gris ; écusson gris ; balanciers fauves, macrochètes noirs ; abdomen gris, avec des macules basilaires, trapézoïdales, ainsi qu'un fort petit trait de chaque côté, noirs, marqués sur tous les segments, sauf les derniers qui sont d'un fauve luisant ; pieds d'un testacé un peu brunâtre, plus foncé vers l'extrémité des cuisses, des tibias et des segments tarsiens, macrochètes noirs ; ailes presque hyalines, nervures brunes.

Uruguay. — Ma collection.

Genre SEILOPOGON (olim *Cheilopogon*, Rondani).

1. S. GOUGELETI, ♂. — Long. 22 mill.

Nigrum : facie albidâ ; scapulis obscurè cinereis ; abdomine vittis quatuor utrinque albidis ; halteribus et pulvillis castaneis ; alis pallidè cinereis.

D'un noir opaque, excepté : face blanchâtre ; épaules, bords du thorax,

d'un gris obscur, base de l'écusson à reflets gris; balanciers brunâtres; abdomen, 2^e-5^e segments ornés de chaque côté de demi-bandes transversales blanchâtres, sises aux bords postérieurs, pelotes fauves; ailes d'un gris clair.

Tanger. — Ma collection.

Dédié à feu Gougelet, voyageur au Maroc.

2. *S. OLGESCI*, ♀. — Long. 18 mill.

Nigrum, undique cinereo, satís dense, villosum: antennis castaneis, mystace, barbâ, setis palporum et occipitis, cinereis; halteribus fuscis; pulvillis testaceis; alis ferè hyalinis, venis fuscis, pallidè fusco limbatis, apice et intus albidis.

D'un noir un peu luisant, entièrement couvert d'une villosité assez dense, grisâtre: antennes brunes, moustache, barbe, soies des palpes et de l'occiput, épaisses, grises, face d'un gris pâle; villosité moins épaisse sur les flancs, à la base, au milieu, à l'extrémité de l'abdomen, ainsi qu'à la base des segments, plus dense au contraire sur les côtés et aux bords postérieurs desdits segments; balanciers brunâtres; pelotes fauves; pieds avec un duvet très-court, macrochètes des tibias noirs; ailes presque hyalines, nervures brunes et finement bordées d'un brun très-pâle, principalement à la base.

Tanger. — Ma collection.

3. *S. RUBIGINOSUM* (sexe ?). — Long. 20 mill. ?

(Detritum et mutilatum). Setis palporum castaneis, vertice fulvo; thorace rubiginoso, vittis quatuor parum distinctis, utrinque abbreviatis, fuscis; halteribus castaneis; abdomine fulvo, maculis utrinque, segmentorum 2-5^a, dilutè fuscis, subtilis pallidè cinereis; pedibus rubiginosis, pulvillis testaceis; alis ferè hyalinis, apice pallidè cinereis.

Fort détérioré: partie antérieure de la tête, extrémité de l'abdomen et pieds antérieurs, manquent.

Palpes rougeâtres, à soies brunâtres, le haut du front roux, les soies

derrière la tête noires; thorax rougeâtre, avec quatre bandes brunes peu marquées, les latérales fort raccourcies en avant, épaules un peu plus pâles que le disque; balanciers bruns; écusson rougeâtre; abdomen d'un fauve clair, segments 2-5, avec une bande brune, de chaque côté, diffuse, et, en dessous, en arrière de celle-ci, une macule de reflets blanchâtres; pieds rougeâtres, cuisses postérieures intérieurement brunes, base des tarses postérieurs plus pâle, macrochètes tarsiens noirs; ailes d'un gris très-clair, presque hyalines à la base, nervures brunes.

Amer. boreal. — Ma collection.

Genre STENOPOGON (Loew, Schiner).

1. S. BICOLOR, ♂. — Long. 18 mill.

Nigrum, satis nitidum. Antennis nigris, basi obscure rubidis, segmentis 1-2 rufo pilosis; facie nigrâ, utrinque albo flavido, mystace nigro, barbâ nigrâ; palpis nigro pilosis; orbitis retrorsum, collo, marginibusque laterilibus et posticis thoracis, setis longis rubidis instructis, retrorsum setis nigris, sparsis, callis humeralibus rubidis, sicut et genitalibus; halteribus testaceo albido; pedibus rubidis, spinis ejusdem coloris, femoribus, basi, late nigris et nigro pilosis; alis satis pallide fuscis, extrinsecus et basi obscurioribus.

Entièrement d'un noir assez luisant; antennes noirâtres, les deux premiers articles d'un rougeâtre obscur, avec les soies d'un fauve rougeâtre; face noire, côté d'un blanc grisâtre; moustache, barbe et soies des palpes noires, soies derrière la tête, celles du col, ainsi que des bords latéraux et postérieurs du thorax, d'un rouge fauve; callosités humérales de même couleur; quelques soies noires à la partie postérieure du thorax; écusson avec quelques soies noires au bord postérieur, entremêlées de soies d'un rouge fauve; flancs d'un noir opaque; abdomen, en dessous, à villosité noirâtre; organes ♂ d'un rouge fauve, luisant; balanciers d'un blanc testacé; pieds d'un rougeâtre fauve, avec épines de même nuance, base des cuisses largement noire, avec villosité noire et quelques épines rougeâtres, ongles noirs; ailes brunâtres, notablement plus foncées vers la base et le bord externe.

Europe méridionale. — Ma collection.

Les notables différences de coloration que l'on remarque entre les mâles et les femelles, chez certaines *Dasypogonides* exotiques, me portent à supposer que cette espèce pourrait être le mâle du *S. coracinus*, (sic) dont le docteur Loew décrit la femelle. (Linn., Entom., 1837, p. 454 ?)

2. *S. FUSCOLIMBATUM*, ♂ ? ♀. — Long. 22 mill.

Testaceo et fusco pictum : antennis rubiginosis, apice incisuris que fuscis ; mystace barbâque cinereo flavido ; thorace fulvo rubido, lateribus et scutello flavescentibus, vittis quatuor, lateralibus abbreviatis, fuscis ; halteribus fulvis ; abdomine fulvo, vittâ dorsali nigrâ ; tibiis fulvis, femoribus extrinsecus, fuscis, macrochætis albidis ; alis serè hyalinis, extrinsecus limbo, fuscato.

D'un fauve testacé varié de noir : antennes rougeâtres, extrémité des 2^e et 3^e articles, ainsi que la base du dernier, brunes ; face et moustache d'un gris jaunâtre, barbe blanchâtre, soies de l'occiput et du vertex rousâtres, front brun ; thorax d'un fauve rougeâtre en avant, côtés, bords postérieurs, écusson, jaunâtres, quatre bandes noirâtres, les deux latérales s'arrêtant un peu en avant de la suture, macrochètes jaunâtres en arrière, flancs brunâtres en avant ; balanciers fauves ; abdomen fauve, une bande médiane et bords des derniers segments, noirâtres ; hanches à longs poils blanchâtres ; pieds fauves, cuisses extérieurement noirâtres, couvertes d'un fin duvet clair-semé et de macrochètes blanchâtres ; ailes presque hyalines, nervures et bande au bord extérieur brunes, plus foncées au stigmaté.

Deux individus, avec les abdomens mutilés à l'extrémité, me semblent être des mâles ? Ils diffèrent du précédent comme il suit :

Mystace fusco ; setis occipitis fulvis ; macrochætis thoracis nigris ; tibiis posticis fulvo obscuro, macrochætis serè cunctis nigris ; halteribus pallide testaceis ; limbo alarum pallidior.

Mexicus. — Ma collection.

3. *S. FRATERNUM*, ♀. — Long. 22 mill.

Nigro nitido : antennis basi nigris : palpis nigro setosis, facie nigrâ.

mystace flavo, barbâ pallidè flavâ, setis frontis, verticis et occipitis, nigris; thorace nigro piloso, retro et utrinque, macrochætis nonnullis fulvis, pleuris cinereo villosis; halteribus fulvis; abdomine basi parçè cinereo villoso; pedibus nigris, tibiis basi latè rubiginosis, femoribus cinereo parçè villosis, tibiæ macrochætis fulvis, pulvillis testaceis; alis pallidè fuscis, venis basi fulvis.

D'un noir brillant : antennes à base noire (*le reste manque*) ; palpes noirs, à poils noirs, face noire, moustache et barbe jaunes, soies de la base des antennes, du frônt, du vertex et de l'occiput, noires ; thorax à villosité clair-semée noirâtre, de chaque côté, en arrière et sur l'écusson quelques macrochètes fauves ; base de l'abdomen à villosité grisâtre, blanchâtre en dessus ; flancs à poils jaunes ; abdomen assez luisant ; balanciers fauves ; pieds noirs, tibias presque entièrement rougeâtres, noirs à l'extrémité, un peu de duvet gris sur les cuisses, tous les macrochètes fauves, pelotes aunâtres ; ailes un peu brunâtres, base et nervures basilaires fauves.

Australia. — Ma collection.

4. 5. ALBIBASIS, ♂. — Long. 12 mill.

Fulvum. Segmento antennarum tertio, nigro; facie nigrâ; palpis nigris albido setosis; mystace barbâque albidis; thorace vittis binis, postice abbreviatis, et, utrinque, maculâ oblongâ magnâ, nigris; pectore nigro; halteribus pallidè testaceis; trochanteribus albido pilosis, pulvillis testaceis; alis pallidè cinereis, basi latè albidis.

Antennes, 3^e segment assez court, ovulaire allongé, chète de moitié moins long. Ailes, 4^e la cellule postérieure, sessile, et l'anale, entr'ouvertes. Entièrement fauve, excepté : antennes, extrémité du 2^e segment et 3^e, noirs ; palpes noirs, à poils blanchâtres ; face noire ; front noir, clair-semé de poils bruns ; derrière de l'occiput avec quelques soies jaunâtres ; moustache et barbe blanchâtres ; thorax, avec deux bandes longitudinales contiguës, atténuées en arrière et se terminant à la hauteur de l'insertion des ailes, de chaque côté, une large macule oblongue, noire ; base des hanches et poitrine noirâtres ; un peu de duvet blanchâtre de chaque côté, ainsi qu'aux segments abdominaux, principalement sur les derniers ; des poils blanchâtres aux hanches ; pieds avec quelques poils courts, clair-semés, blanchâtres, pelotes testacées ; balanciers blanchâtres ;

ailes d'un gris très-pâle, moitié basilaire blanche, nervures marginale et 2^e longitudinale, fauves.

California. — Ma collection.

Genre ANISOPOGON (Loew, olim *Heteropogon* Loew, Schin.).

1. A. VESPOÏDES, ♂. — Long. 24 mill.

Nigro flavoque pictum : antennis fuscis, basi castaneis; facie flavilâ, mystace barbâque testaceis; thorace pallidè flavo, vittâ medianâ, maculis utrinque, nigris, pleuris nigris, flavido variegatis; scutello pallidè flavo; halteribus fulvis; abdomine flavo, basi villis quinque latis, nigris, genitalibus fulvis; tibiis fulvis, femoribus, supernè, latè nigris; alis pallidè flavis, venis basi fulvis.

Varié de noir et de jaune : antennes noires à base brunâtre ; moustache, soies des palpes et barbe, jaunâtres, poils de l'occiput roux, face d'un jaune pâle ; thorax jaune, une bande médiane, et, de chaque côté, deux larges macules trapézoïdales, noires ; écusson jaune ; flancs à reflets et sutures noirâtres, en arrière du disque, des macrochètes roux ; balanciers testacés ; abdomen jaune, cinq larges bandes transversales, à la base des segments, noires ; hanches noires, à poils jaunes ; pieds d'un fauve rougeâtre, cuisses extérieurement et en dessus, noirâtres, macrochètes fauves ; ailes d'un jaunâtre fort pâle, nervures brunes, fauves à la base.

California. — Ma collection.

2. A. SENILE, ♂. — Long. 13 mill.

Nigro fusco : antennis nigris; facie, setis faciei, frontis et occipitis, cinereis, barbâ albidâ; mystace, setis pulporum et macrochaetis verticis, nigris; thorace cinerco, pleuris, trochanteribus, femoribusque, subtus, albidò villosulis; ventre pallido flavo piloso; abdomine femoribusque nigris, tibiis fulvis, intermediis, supernè nigro penicillatis, posticis nigro annulatis, femoribus intermediis subtus, ad apicem, densè nigro penicillatis; tarsis apice castaneis; alis hyalinis.

D'un noir brun foncé : antennes noires, soies de la partie supérieure de la moustache, face et poils de l'occiput, gris, barbe blanche, soies des palpes, moustache, quelques macrochètes sur le vertex et l'occiput, noirs ; thorax grisâtre, à duvet gris, des poils blancs, longs et épais, sur les flancs, les hanches et le dessous des cuisses ; abdomen noir, glabre en dessus, de longs poils jaunâtres en dessous ; cuisses noires, intermédiaires avec une touffe de poils courts, très-serrés, noirs, en dessus et près de l'extrémité, tibias fauves, avec duvet blanchâtre et macrochètes noirs, postérieurs noirâtres au milieu ainsi qu'à l'extrémité, intermédiaires, en dessus, avec une touffe de poils, semblable et correspondante à celle des cuisses, sise à peu près vers leur milieu, tarses fauves, extrémité brune ; balanciers d'un testacé pâle ; ailes hyalines, nervures brunes ; organe ♂ très-peu ou point distinct.

California. — Ma collection.

Genre LASTAURUS (Loew, Schiner).

L. FENESTRATUS, ♀. — Long. 14 mill.

Niger : antennis castaneis ; palpis nigro setosis, mystace pallide flavo, barbâ nigrâ, setis occipitis et verticis pallide fulvis, facie pallide cinereâ ; thorace, scapulis, et, retrorsum utrinque, macrochætis fulvis, supernè nonnullis nigris intermixtis, pleuris et abdomine nitidis ; halteribus fulvis ; trochanteribus flavo setosis ; pedibus castaneis, posticis fuscis, pulvillis testaceis, macrochætis nigris ; alis ferè hyalinis, venis pallide sed latè fusco limbatis.

Noir : antennes brunes, palpes noirs, à poils noirs ; moustache d'un blanc jaunâtre ainsi que la barbe, soies de la base des antennes, du vertex et de l'occiput, d'un fauve obscur ; thorax à villosité jaunâtre courte et clair-semée, de même que sur les côtés à la base de l'abdomen, sur les côtés du disque, en arrière, ainsi que sur l'écusson, en dessus quelques macrochètes fauves, quelques autres de couleur noire, épaules fauves, en dessus flancs et abdomen luisants ; hanches d'un noir luisant, avec des poils jaunes ; balanciers fauves, pieds d'un rougeâtre obscur, un peu brunâtre à la base des cuisses, les postérieures brunes, macrochètes

noirs; pelotes testacées; ailes presque hyalines, nervures brunes, un peu fauves à la base et largement bordées d'un brunâtre pâle.

Nov. Granata. — Ma collection.

Genre LOCHITES (Schiner).

1. L. TESTACEUS, ♂, ♀. — Long. 15 mill.

Testaceo flavido, thorace nigro parcè punctato: ♂, antennis fulvis, segmento 3° supernè fusco maculato; facie mystace barbâque pallidè flavis, palpis nigro setosis; thorace flavescente; halteribus testaceis, apice fuscis; abdomine testaceo, apice fulvo, segmento 5°, basi, utrinque, vittâ transversali angulosâ punctoque dorsali, nigris; genitalibus ♂, nigro fulvoque pictis; pedibus testaceis, femoribus posticis apice supernè, tarsisque cunctis apice, fuscis; alis testaceis. — ♀, facie pallidiorè, vertice nigro; abdomine, segmento 3° vittâ utrinque angulosâ, nigrâ, 4-6^a vittis latis, maculis duabus includentibus quadratis testaceis, nigris, 7^a nigro fusco; halteribus testaceis.

D'un testacé fauve, thorax avec quelques points noirs: ♂, antennes fauves, 3^e article maculé de brun en dessus; face, moustache et barbe, d'un jaune pâle, palpes noirs, à poils noirs; thorax jaunâtre, un peu grisâtre en dessus, écusson et flancs d'un jaunâtre clair; abdomen fauve vers l'extrémité, 4^e segment, de chaque côté, avec une macule diffuse, 5^e avec une bande courbée à angle droit, extérieurement, et un point dorsal, au bord postérieur, noirâtres; organe ♂, noirâtre à la base; balanciers fauves, avec l'extrémité brune; pieds testacés, une macule à l'extrémité des cuisses postérieures, en dessus, ainsi que l'extrémité des tarses, de couleur brune; ailes testacées. — ♀. Face plus pâle, vertex noirâtre; balanciers testacés; abdomen, 3^e segment avec une bande transversale, basilaire, de chaque côté, courbée latéralement à angle droit, 4^e-6^e chacun avec une large bande transversale médiane, qui renferment deux macules carrées, testacées, 7^e segment d'un brun noirâtre.

Birmanïa. — Ma collection.

2. L. ASILOÏDES, ♂. — Long. 19 mill.

Cinereo flavido, pedibus fulvis : antennis palpisque fulvis ; facie, mystace et barbâ pallidè flavis ; thorace cinereo flavido, macrochætis fuscis, vittis quatuor fuscis, intermediis juxta-positis, lateralibus abbreviatis ; halteribus testaceis ; abdomine fusco pallido, segmentis, utrinque et apice, testaceo marginatis, genitalibus ♂, fulvis, nigrò pilosis ; tibiis posticis et segmentis tarsorum apice, macrochætis, nigris ; alis ferè hyalinis.

D'un gris jaunâtre : antennes et palpes jaunes ; moustache, barbe, soies des palpes, poils de l'occiput, d'un gris jaunâtres ; thorax un peu fauve en dessus, principalement aux épaules, quatre bandes noirâtres, intermédiaires contiguës, latérales se terminant un peu en avant de la suture ; balanciers testacés ; abdomen noirâtre, segments finement bordés de testacé pâle, et, de chaque côté, un peu teintés de fauve à l'extrémité ; organe ♂ rougeâtre, avec de longs poils noirs ; extrémité des tibias postérieurs, des tarses et de tous leurs segments basilaires, tous les macrochètes, noirs ; pelotes testacées ; ailes presque hyalines, un peu de gris très-pâle à l'extrémité.

Brazil. — Ma collection.

3. L. FULVUS, ♂. — Long. 15 mill.

Fulvus : facie cinereâ, mystace barbâque albidis ; dorso thoracis castaneo, halteribus, apice, castaneis ; tarsis, apice, fuscis ; alis pallidè testaceis.

D'un fauve obscur : antennes fauves, palpes bruns, à poils noirs ; moustache et barbe blanchâtres, face pâle ; disque du thorax brun rougeâtre, des macrochètes noirs en arrière ; balanciers fauves, avec l'extrémité brune ; tarses bruns à leur extrémité, ainsi qu'à l'extrémité des articles basilaires, pelotes fauves ; ailes d'un testacé pâle.

Amazonia. — Ma collection.

4. L. NIGRIVENTRIS, ♀. — Long. 10 mill.

Gracilis. Thorace fusco cinereo trivittato, abdomine nigro nitente, pedibus fulvis : antennis fulvis, supernè et apice fuscis ; facie albidâ, mystace et barbâ sparsis, albidis ; vittâ thoracis, lineâ intermediâ exili divisâ, lateralibus brevissimis, pleuris, albescentibus ; scutello cinereo ; halteribus albidis, apice infuscatis ; femoribus, supernè, tibiis, apice, tarsisque fusciscentibus ; alis hyalinis.

Très-grêle. Thorax grisâtre, avec trois bandes brunes, abdomen d'un noir luisant, pieds fauves : antennes fauves, un peu de brunâtre en dessus et à l'extrémité ; moustache et barbe, courtes, très-peu fournies, blanches, face blanche ; la bande intermédiaire thoracique divisée au milieu par une ligne plus claire, les latérales fort courtes, dépassant à peine la suture, flancs blanchâtres ainsi que l'écusson ; balanciers blanchâtres, massue un peu brunâtre ; ventre fauve ; dessus des cuisses, extrémités des tibias et tous les tarses, brunâtres ; cuisses postérieures légèrement renflées en massue ; ailes hyalines.

Chili. — Ma collection.

Genre SENOBASIS (Macq., Schiner).

S. MODESTUS, ♂. — Long. 17 mill.

Fuscus : antennis fuscis, basi rubiginosis ; facie fuscâ, utrinque cinereâ, mystace albido, palpis fulvis, fusco setosis, barbâ cinereâ ; thorace castaneo univittato, scapulis castaneis, pleuris ejusdem coloris, cinereo bilimbatis ; scutello castaneo ; halteribus id. ; pedibus fulvis, femoribus anterioribus et intermediis, intus, fuscis ; alis pallidè testaceis, extrinsecus, latè fulvis.

Brunâtre. Antennes brunes, 1^{er} article rougeâtre ; palpes rougeâtres, à soies brunes ; rostre brun ; face brunâtre, avec les côtés grisâtres, moustache et barbe, très-peu fournies, grisâtres, soies de l'occiput brunes ; thorax un peu grisâtre sur les côtés ; une large bande dorsale, écusson,

épaules et flancs, d'un brun rougeâtre foncé, ces derniers traversés par deux larges bandes obliques, irrégulières, grises; balanciers brunâtres; abdomen un peu luisant, avec un très-fin duvet clair-semé, jaunâtre; hanches grises; pieds fauves, cuisses antérieures, intérieurement, tibias antérieurs, bruns, macrochètes noirs, pelotes testacées; ailes jaunâtres, le bord externe, largement, d'un fauve clair.

Amazonia. — Ma collection.

Genre XYPHOCERUS (Macq., Schin.).

1. X. MACULATUS, ♀. — Long. 15 mill.

Antennis fulvis, palpis fusco rubido setosis; barbâ ejusdem coloris, mystace auratâ, facie argentâ, vittâ et fronte nigris; thorace nigro, scapulis, margine posticâ scutelloque, rubido fulvo; abdomine nigro, segmentis 2^{is} 4^{is}, utrinque, flavo maculatis, 5^o apice et sequentibus, fulvido flavo, 1^o, utrinque et 5^o, basi, latè argenteo micantibus; halteribus fulvis; pedibus fulvis; alis pallidè cinereo flavo, apice venis fuscis, et latè pallidè fusco limbatis, extrinsecùs testaceis, limbo transversali pallidè fusco.

Antennes fauves, palpes noirs, soies d'un brun rougeâtre; barbe de même nuance, moustache dorée, face blanche, avec une bande médiane, noire, front et vertex noirs, poils de l'occiput grisâtres; thorax noir, duvet clair-semé blanchâtre, épaules, bord postérieur, écusson, fauves, macrochètes de même couleur, flancs à reflets blanchâtres; balanciers fauves; hanches à reflets et poils blancs; abdomen noir, un peu de duvet blanc à la base, 2^e et 4^e segment, chacun avec une large macule latérale, triangulaire jaune, au bord postérieur, 5^e avec le bord postérieur et les derniers, fauves, 1^{er}, de chaque côté, vers son milieu et 5^e, à sa base, avec des larges bandes de reflets argentés; pieds fauves; ailes presque hyalines, base avec une bande externe testacée, moitié postérieure avec les nervures brunes largement bordées de grisâtre et plus foncées vers le milieu du disque.

Cap. R. Sp. — Ma collection.

2. X. VARIEGATUS, ♂. — Long. 11 mill.

Antennis basi nigris ; mystace albido, basi flavido, setis palporum flavis, barbâ setisque occipitis albis, fronte nigrâ ; thorace cinereo-nigro, angulis posticis latè croceis ; scutello nigro ; halteribus testaccis, apice flavis ; abdomine nigro, segmentis 2-3^a, utrinque croceo notatis, 4^e apicè, 5^a et 6^a totis, ejusdem coloris, genitalibus ♂, nigris ; pedibus nigris, anterioribus et geniculis fulvis, tibiis intermediis extrinsecus fulvis, femoribus posticis, imâ basi, tibiisque, fulvis, apice nigris ; alis, basi hyalinis, extrinsecus fulvis, apice latè fuscis.

Antennes à base noire (*le reste manque*), face, moustache, barbe, soies occipitales, d'un blanc argenté, front noir, épistome et palpes couverts de soies d'un jaune citron, col d'un noir luisant ; thorax entièrement d'un noir grisâtre, à duvet blanc, deux larges macules conjuguées au bord postérieur, orangées ; écusson noir ; balanciers testacés, à massue d'un jaune citron ; abdomen noir, avec quelques reflets blancs, 2^e et 3^e segments, de chaque côté du bord postérieur, ornés de larges macules triangulaires orangées, bord postérieur du 4^e, largement, ainsi que les suivants, orangés, organe ♂ d'un noir luisant ; pieds antérieurs noirs, genoux fauves, intermédiaires, tibias fauves, avec une ligne peu distincte intérieurement et l'extrémité, noires, postérieurs, base des cuisses, tibias, sauf l'extrémité, fauves, macrochètes blancs ; ailes presque hyalines à la base, fauves au bord externe, moitié postérieure brune.

Cap. B. Sp. — Ma collection.

3. X. FULVICOLLIS, ♂. — Long. 12 mill.

Antennis ? Facie fronteque nigris, mystace fulvo, setis palporum, barbâ, pilis occipitis, rubiginosis ; thorace nigro, scapulis, angulis posticis latè, scutelloque apicè, rubiginosis ; halteribus fulvis ; abdomine nigro, segmentis rubiginoso latè marginatis, genitalibus ♂, pedibus totis, ejusdem coloris ; alis basi cinereis, extrinsecus et dimidiâ parte apicali fuscis.

Antennes ? (*manquent*) : face et front noirs, moustache d'un fauve obscur, soies des palpes, de la barbe et de l'occiput, rougeâtres ; thorax

noir, fin duvet clair-semé gris, bord antérieur, épaules, deux larges macules aux angles postérieurs, rougeâtres, extrémité de l'écusson de même couleur; balanciers fauves; abdomen noir, avec un fin duvet gris et quelques reflets blanchâtres, tous les segments largement bordés de rougeâtre, organe ♂ de même couleur; ailes à base claire, bord externe et moitié postérieure bruns; pieds entièrement rougeâtres, macrochètes blancs.

Natal. — Ma collection.

Genre LAPHYCTIS (Loew, Schiner).

L. STIGMATICALIS, ♂. — Long. 10 mill.

Niger. Antennis nigris; facie cinerea, mystace barbâque albidis; scapulis, abdominis segmentis, utrinque, limbo apicali et maculâ intermediâ, testaceo cinereo pictis, genitalibus ♂, fulvis; halteribus flavis, basi fulvis; femoribus fulvis et supernè fusco vittatis, tibiis testaceis, apice fuscis; alis obscure testaceis, extrinsecis parum infuscatis.

Noir : antennes noires; face, moustache, barbe, soies occipitales, d'un gris jaunâtre; épaules, bords postérieurs des segments abdominaux, de chaque côté, plus, une macule arrondie, vers le milieu, testacé grisâtre, organe ♂ fauve; balanciers d'un blanc jaunâtre à base fauve; cuisses fauves, avec une bande brune en dessus, tibias testacés, avec l'extrémité brune, tarses postérieurs un peu rougeâtres à l'extrémité; ailes grisâtres, bord externe légèrement brunâtre et base fauve.

Ceylan. — Ma collection.

Genre LASIOCNEMUS (Loew, Schiner).

L. CALCEOLATUS, ♂. — Long. 8 mill.

Niger, tibiis posticis, basi, tarsisque, cunctis, testaceis, onychiis nigris; antennis castaneis; facie, mystace parçè piloso, cinereis; halteribus fuscis;

alis pullidè flavis, vittâ stigmaticali abbreviatâ, fuscâ, stigmato testacco.

Noir : antennes brunâtres ; face, moustache très-peu fournie, grises, barbe nulle ; bord antérieur du thorax luisant, flancs un peu grisâtres ; balanciers bruns ; abdomen un peu luisant, quelques légers reflets blanchâtres aux bords des segments ; pieds noirs, un peu de fauve à la base des tibias, tarses fauves, ongles noirs, macrochètes courts et noirs ; ailes un peu roussâtres, testacées au stigmat, avec une petite bande transversale noirâtre, allant du milieu du disque au bord extérieur.

Amazonia. — Ma collection.

Genre CACODÆMON (Schiner).

C. QUADRINOTATUM, ♂. — Long. 15 mill.

Nigrum : facie nigrâ, vittâ transversali argentâ, fronte nigrâ, mystace albido, barbâ, setis palporum et occipitis, nigris, pilis verticis cinereis ; thorace albido quadrimaculato ; alis fuscis, extrinsecùs latè fulvo vittatis ; halteribus nigris.

Noir : antennes à base brune (*le reste manque*), face noire, avec une large bande transversale argentée, au-dessous des antennes, moustache blanche, soies des palpes, barbe, poils de l'occiput, noirs, soies du vertex grises ; thorax avec duvet gris, court, mélangé de noir, macrochètes noirs, quatre macules blanches, sur le disque, dont deux en avant, obliques, allongées, et deux contre la suture, arrondies ; hanches antérieures et intermédiaires, extrémité de l'abdomen, à poils gris ; balanciers noirs ; pelotes brunâtres ; ailes noirâtres, plus pâles à l'extrémité ainsi qu'au bord interne, une large bande longitudinale, située vers le milieu du bord externe, d'un orangé rougeâtre.

Chili. — Ma collection.

Genre BATHYPOGON (Loew, Schiner).

1. B. CINEREUM, ♀. — Long. 17 mill.

Cinereum : *antennis fuscis; mystace, setis palporum et occipitis barbâque cinereis; thorace fusco obscure quadrivittato, vittis lateralibus abbreviatis, macrochætis pallidè cinereis; halteribus testaceis; abdomine, parè et breviter cinereo villosa, segmento ultimo nitente, rubido, apice nigro; pulvillis testaceis; alis pallidissimè cinereis.*

Grisâtre, avec un duvet court, peu serré, gris : antennes noirâtres, base à poils gris, soies des palpes, face, moustache, barbe, soies occipitales, grises; thorax avec quatre bandes longitudinales brunes, peu distinctes, les latérales larges, interrompues au milieu et terminées à la suture, quelques macrochètes grisâtres en arrière; balanciers testacés; abdomen avec un court duvet gris et quelques macrochètes blanchâtres, dernier segment luisant, rougeâtre, avec l'extrémité noire; pieds avec un fin duvet et des macrochètes blanchâtres; tibias obscurément fauves à la base, pelotes testacées; ailes presque hyalines, nervures brunes.

Colombia. — Ma collection.

2. B. PARVUM, ♂. — Long. 13 mill.

Cinereum : *antennis fulvis, basi nigris; setis palporum verticisque nigris, barbâ albidâ, mystace pallidè testaceo, facie albidâ; halteribus tibiisque anterioribus et intermediis fulvis; femoribus posticis, infernè, parè nigro spinosulis; alis cinereis.*

Grisâtre : antennes fauves, 1^{er}, 2^e et base du 3^e article bruns; palpes noirs, à poils noirs, face blanche, ainsi que la barbe et les soies occipitales, celles du vertex brunes, moustache d'un blanc jaunâtre; balanciers testacés; base des segments abdominaux largement noirâtre; hanches et pieds à duvet et poils blancs, genoux, tibias antérieurs et intermédiaires fauves, avec macrochètes noirs et duvet blanc, cuisses, un peu renflées, garnies en dessous de duvet blanc, les postérieures avec quelques épines noires, clair-semées, pelotes roussâtres; ailes grisâtres.

Chili. — Ma collection.

3. B. MACULIPES, ♂, ♀. — Long. 22 mill.

Fuscum, femoribus, ♂, rubiginoso maculatis; ♀, ferè totis ejusdem coloris: ♂, antennis nigris, facie, mystace barbâque cinereis, setis palporum frontisque nigris; thorace, lateribus, pleuris, macrochætis et scutello, cinereis; halteribus fulvis; femoribus posticis, subtus, latè rubido maculatis, intermediis et anterioribus ejusdem coloris, basi et apice nigris, tibiis anterioribus infernè, latè similiter maculatis; alis pallidè cinereis, venis basi testaceis. — ♀, simillima; femoribus, tibiis, rubiginosis, apice nigris.

Noirâtre, clair-semé de duvet gris : antennes noires ; palpes noirs, à poils noirs, moustache, barbe, poils derrière la tête et face, gris, front noir, à poils noirs ; thorax gris sur les côtés, les flancs et l'écusson, quelques macrochètes gris en arrière ; abdomen noir, des soies blanches en dessous, noirâtres à l'extrémité ; balanciers fauves ; pieds noirs, avec un fin duvet grisâtre, hanches, dessous des cuisses et des tibias, à longs poils blanchâtres, cuisses antérieures et intermédiaires largement teintées de rougeâtre au milieu, postérieures, en dessous, avec une macule allongée, tibias antérieurs avec une macule semblable, mais plus petite, rougeâtres, macrochètes des tibias jaunâtres, pelotes et base des ongles fauves ; ailes un peu grisâtres, surtout à l'extrémité, nervures fauves à la base. — ♀, en tout semblable, excepté : abdomen grisâtre, dépourvu de poils blancs en dessous ; cuisses et tibias moins velus, les premières fauves, noires à l'extrémité, tibias semblablement colorés.

Australia. — Ma collection.

Genre TRICLIS (Loew, Schiner).

T. NOTATA, ♀. — Long. 10 mill.

Nigra, segmentibus abdominis, utrinque, albido notatis: antennis basi nigris; facie barbâque albidis, mystace ejusdem coloris, supernè pallidissimè flavo; thorace obscurè cinereo; halteribus testaceis; abdomine nigro; femoribus posticis basi, tibiisque cunctis basi, fulvis; alis ferè hyalinis.

(1878)

1^{re} partie, 28.

D'un noir grisâtre : antennes à base noire (*le reste manque*), face blanchâtre, moustache, barbe, soies occipitales, blanches, les moustaches un peu jaunâtres en dessus ; thorax, écusson, d'un gris obscur, avec un fin duvet grisâtre ; balanciers fauves ; abdomen noir un peu luisant, chaque segment avec des macules latérales, triangulaires, blanches, à la base ; pieds à reflets gris, macrochètes blancs ; cuisses postérieures, à la base, et en dessous, à l'extrémité, tibias à la base et pelotes, fauves ; ailes presque hyalines, à nervures brunes.

Am. boreal. — Ma collection.

Genre SCYLATICUS (Loew, Schiner).

1. S. PANTHERINUS, ♂. — Long. 9 mill.

Fulvus . antennis fulvis, basi nigris ; facie, mystace, barbâ, setis palporum, albidis ; thorace velutino, fulvo, nigro notato, pleuris partim fuscis ; halteribus fulvis, apice fuscis ; abdomine, segmentorum lateribus et apice, villosis, pallidè flavis ; alis cinereis, basi pallidè testaceis.

Fauve : antennes noires, 1^{er}, 2^e et base du 3^e article, fauves ; thorax fauve, quelques reflets blanchâtres en avant, noirâtres sur les flancs, quelques macules irrégulières, et quatre autres arrondies, noires ; balanciers fauves, extrémité brunâtre ; abdomen avec des bandes transversales de chaque côté, aux bords postérieurs des segments, d'un jaune pâle, derniers segments presque entièrement couverts d'un duvet jaunâtre ; ailes d'un gris pâle, légèrement jaunâtres près de la base.

Sénégal. — Ma collection.

2. S. RUFICAUDA, ♀. — Long. 9 mill.

(*Detritus.*) *Fuscus ; scapulis, thoracis lateribus et apice abdominis, fulvis : antennis fulvis, basi fuscis ; facie et mystace cinereis ; halteribus testaceis ; pedibus fulvis, tibiis posticis, apice, tarsisque fuscis ; alis parum fusciscentibus, maculâ medianâ diffusâ, fuscâ.*

(*Détérioré.*) Noirâtre : antennes fauves, premier article brun ; face et

moustache grisâtres, front brun ; épaules, côtés et flancs, rougeâtres, ceux-ci à larges reflets bruns ; écusson noirâtre ; abdomen d'un noir assez luisant, les derniers segments rougeâtres en dessus ; balanciers d'un testacé obscur ; hanches noires ; pieds fauves, les tibias postérieurs et tous les tarses un peu brunâtres vers l'extrémité, pelotes testacées ; ailes un peu brunâtres, avec une macule noirâtre, diffuse, vers le milieu du disque.

Amazonia. — Ma collection.

3. S. VERTEBRATUS. — Long. 12 mill.

♀ ? . *Antennis castaneis ; haustello nigro ; facie albido flavo ; mystace barbâque pallidioribus ; thorace fulvo obscuro pruinoso ; halteribus testaceis ; abdomine nitido, nigro, segmentis 1-4^{te}, flavo, utrinque maculatis, apice fulvo villosa ; pedibus pallide fulvis, femoribus superne parum infuscat, posticis obscurius, tibiis et tarsis posticis fuscis ; tarsis anterioribus, incisuris et apice parum infuscat, pulvillis testaceis ; alis subhyalinis, apice late pallide cinereis.*

♀ ? . Antennes d'un brun roussâtre ; trompè noire ; face, barbe, moustache, d'un blanc jaunâtre ; thorax d'un roussâtre pulvérulent, flancs et balanciers testacés ; abdomen luisant, noir, 1^{er} segment, avec deux taches latérales, 2^e et 3^e, avec deux macules irrégulièrement triangulaires, 4^e, avec deux macules latérales, trigonales, d'un jaune un peu foncé ; extrémité couverte de poils jaunes ; des soies, placées en avant des balanciers, testacées ; pieds d'un testacé fauve, dessus des cuisses un peu brunâtre, notablement plus foncé aux cuisses postérieures, tibias et tarses postérieurs bruns, extrémité, articulations des autres, brunâtres, pelotes testacées ; ailes presque hyalines, extrémité largement teintée d'un gris clair.

Java. — Ma collection.

4. S. RUBRIPES, ♂, ♀. — Long. ♂, 14 mill. ; ♀, 15 mill.

Niger, antennis pedibusque pallide croceis : ♂, facie pallide flavâ, mystace, barbâ, setis occipitis et palporum, nigris ; scapulis rubiginosis ; halteribus flavidis ; alis pallide cinereis, basi fulvis : ♀, simillima.

♂. D'un noir assez luisant, poils clair-semés, noirs : antennes et pieds entièrement d'un jaune orangé ; face d'un blanc jaunâtre, orbites bordés, en arrière, de reflets blancs, moustache, barbe, soies des palpes, poils derrière la tête et du vertex, noirs ; épaules rougeâtres ; balanciers jaunâtres ; hanches noires, à poils noirs ; ailes gris pâle, d'un fauve pâle à la base et le long du bord externe, surtout aux nervures. — ♀. Semblable, si ce n'est, que les balanciers sont fauves, les macrochètes des tibias et des tarses plus longs et plus nombreux.

Chili. — Ma collection.

Genre CYRTOPOGON (Loew, Schiner, *Eucermostus*, Walker).

C. ? RUFITIBIALE, ♀. — Long. 10 mill. ; oviducte 3 mill.

Nigrum, tibiis rufis, apice nigris : facie nigrâ, convexâ nec manifeste gibbosâ ; utrinque parum cincreâ, barbâ albidâ ; thorace obscure cinereo villosa ; abdomine, utrinque, albido obscure notato ; femoribus, infernè, albido villosis ; halteribus testaceis ; alis pallidè cinereis ; oviducto longo.

Ici la face un peu convexe, mais nullement gibbeuse, ne me permet pas d'affirmer que cette espèce puisse figurer parmi les *Cyrtopogons* (Loew, Schiner). Peut-être ne serait-elle pas déplacée chez les *Eriopogons* (mêmes auteurs) ?

Entièrement noir, excepté : face grisâtre sur les côtés, barbe blanchâtre, poils de l'occiput gris, ceux du thorax gris, au milieu bruns, en arrière jaunâtres, flancs grisâtres ; balanciers testacés ; abdomen un peu luisant, avec un très-fin duvet gris, clair-semé, segments, de chaque côté, avec une large macule blanchâtre, arrondie, près des bords postérieurs ; oviducte allongé, noir ; pieds noirs, à léger duvet jaunâtre en dessus, cuisses, en dessous, garnies de poils de la même couleur, tibias rougeâtres, teintés de noir à leur extrémité, principalement les antérieurs, pelotes brunes ; ailes d'un jaunâtre très-pâle.

Europe. — Ma collection.

Genre HOLOPOGON (Loew, Schiner).

1. H. TENERUM, ♀. — Long. 5 mill.

Nigrum : antennis basi, palpis, mystace setisque frontis, nigris, barbâ albidâ, facie pallidè flavâ ; thorace, scapulis, pleuris, lateribusque cinereis ; halteribus citrinis ; abdomine nitido, segmentis 2-6^a, utrinque, apice, argenteo notatis ; alis pallidè fuscis.

Noir : antennes à base noire (*le reste manque*) ; palpes, moustache très-peu fournie, soies du vertex, du front et de l'occiput, noirs, barbe blanchâtre, face d'un jaune pâle ; balanciers d'un jaune citron ; hanches à reflets blancs et duvet blanc ; abdomen luisant, segments 2-6, de chaque côté, avec une macule allongée, de couleur argentée et sise au bord postérieur ; pieds luisants, cuisses garnies de duvet blanc en dessous, pelotes blanchâtres ; ailes d'un brunâtre assez clair.

Chili. — Ma collection.

2. H. NITIDIVENTRIS, ♀. — Long. 7 mill.

H. tenero similimum, exceptis : thorace fulvo-flavo pruinoso et obscure fusco trivittato, pleuris cinerascentibus ; halteribus pallidioribus ; abdomine cinereo, segmentorum apice, maculis trigonis latis, et puncto, utrinque, nigro nitido ; tarsis pallidè castaneis.

En tout semblable à l'espèce précédente, excepté : thorax couvert d'une pulvérulence roussâtre, flancs grisâtres, balanciers d'un testacé clair ; villosité des hanches et des cuisses plus foncée ; abdomen gris, chaque segment orné, en arrière, d'une large macule trigonale, et, de chaque côté, marqué d'un point arrondi, d'un noir luisant ; tarses un peu brunâtres ; ailes, base des nervures longitudinales d'un testacé foncé, la nuance brunâtre qui borde les transversales, plus marquée et plus intense.

California. — Ma collection.

NOTA. S'il s'agissait de subdiviser un genre, trop abondant en espèces, pour faciliter les déterminations, il est probable que les deux précédentes espèces pourraient être considérées comme les *types* d'une coupe nouvelle :

mais ce n'est pas ici le cas, car les *Holopogons* (Loew), avec lesquels elles ont les plus grandes analogies, sont encore peu nombreux, et la conformation particulière d'une des ramifications des nervures alaires, qui pourrait ici, à peu près uniquement, servir de *criterium*, n'a pas à mes yeux une grande importance. Conséquemment, je laisserai ces deux *Diptères* dans le genre *Holopogon*, lequel, soit dit en passant, ne me paraît pas lui-même bien nettement dessiné ?

3. H. ? APPENDICULATUM, ♂. — Long. 6 mill.

Antennarum segmento 3°, duobus primis simul sumptis, subequali, cheto crassiusculo, brevi, stylo brevissimo, apice munito; vertice longe setoso; facie parum convexâ; mystace longo haud denso, ferè usque ad antennis ascendente; thorace longe, sparsim, setigero; pedibus undique macrochetis longis, sparsis, armatis, pulvillis magnis; alarum venulâ furcæ externâ, retrorsum basi longe appendiculatâ; abdomine depresso; occipite maxime concavo. — Antennis nigris; facie cinereâ, mystace, barbâ, palporum villositate, subalbis; thorace nigro, albido parce piloso, macrochetis nigris instructo; scutello setis densis et longis, marginato; abdomine sordide fulvido, utrinque albido villoso; halteribus pallide testaceis; femoribus fuscis, macrochetis albis; alis ferè hyalinis, venis transversalibus parum infuscatîs.

Antennes, 3^e segment fusiforme, à peu près égal aux deux précédents; chète court, épaissi, paraissant tronqué à son extrémité, laquelle est munie d'un style très-court, aminci; vertex très-concave, face légèrement convexe, quelques longues soies rigides insérées sur le tubercule oculifère fort saillant, moustache peu dense, longue, atteignant presque la base des antennes; thorax très-convexe, parsemé de macrochètes allongés, plus nombreux en arrière; écusson bordé de longues soies rigides, serrées; pieds entièrement clair-semés de longues épines; nervures alaires comme dans le genre *Holopogon*, si ce n'est, que la branche externe de la bifurcation propre à la 4^e nervure longitudinale se montre munie en arrière, à sa base, coudée à angle droit, d'un assez long appendice; abdomen déprimé. — Antennes noires, base à poils noirs; palpes à poils blanchâtres; face grise; moustache et barbe blanchâtres; soies occipitales noires; thorax noir, avec de fines bandes longitudinales, très-peu distinctes, brunâtres; balanciers d'un fauve pâle; macrochètes du thorax et de l'écusson noirs; abdomen d'un rougeâtre obscur, quelques poils blancs sur les côtés;

pieds testacés, parsemés sur toute leur étendue de macrochètes blancs, hanches couvertes de longs poils blanchâtres, cuisses noirâtres, des poils blancs en dessous; ailes presque hyalines, avec la base des nervures longitudinales jaunâtre, et un peu de brunâtre bordant les transversales.

California. — Ma collection.

Genre OLIGOPOGON (Loew).

O. ATRUM, ♂. — Long. 4 mill.

Facie parum proeminente, alarum cellulâ discoïdali magnâ. Atrum, nitidum. Mystace nigro, barbâ nigrâ; halteribus testaceis; alis pallide albidis.

Face assez saillante; cellule discoïdale des ailes grande. Entièrement d'un noir assez luisant, un peu de fin duvet grisâtre sur les côtés de l'abdomen; balanciers testacés; dessous des tarses postérieurs et pelotes, fauves; ailes hyalines, un peu blanchâtres, nervures, à la base et le long du bord externe, d'un testacé pâle.

Natal. — Ma collection.

Genre STICHOPOGON (Loew, Schiner).

1. S. PUNCTIFERUM, ♂. — Long. 10 mill.

Cinereum; abdomine sericeo flavido obscuro; alis fuscis: antennis fuscis, barbâ cinereâ, mystace ejusdem coloris, setis nigris intermixtis; thorace cinereo; halteribus fulvis; abdomine, segmentis 2-6^a, basi, utrinque, fusco notatis, genitalibus ♂ nigris; tibiis latè rufis, apice nigris.

Thorax d'un noir grisâtre, abdomen à reflets soyeux, d'un jaune obscur; antennes noirâtres; barbe grise, ainsi que les soies des palpes, moustache grise, mélangée de soies noires, soies du vertex grisâtres, flancs grisâtres; balanciers fauves; abdomen, segments 2-6, de chaque côté, avec une macule brune, sise près de leur base, les derniers et l'organe ♂, d'un noir luisant; pieds d'un noir luisant, tibias largement teints de rougeâtre à la base, de même que les segments des tarses antérieurs et intermédiaires, macrochètes testacés, pelotes fauves; ailes brunes.

Mauritania. — Ma collection.

2. *S. SCALARE*, ♀. — Long. 10 mill.

Griseo obscuro, abdominis incisuris, albis : mystace, barbâ et faciè, albidis; undique, albido tomentosum et macrochætis albidis armatum; halteribus testaceis; pulvillis testaceis; alis hyalinis.

Entièrement d'un gris noirâtre, couvert d'un fin duvet blanc peu serré, les soies, poils et macrochètes blancs : antennes noires, moustache un peu jaunâtre, balanciers d'un blanc testacé ; flancs et côtés du thorax blanchâtres, écusson bordé de brunâtre ; abdomen noirâtre, bords postérieurs de tous les segments argentés ; pelotes testacées ; ailes hyalines.

Fiji insul. — Ma collection.

3. *S. CINCTELLUM*, ♂. — Long. 11 mill.

Nigrum, fuscum, ferè glabrum. Antennis nigris; fronte obscure cinerea; mystace pallide testaceo; barbâ albidâ; thorace utrinque, vittis, transversalibus, abbreviatis, lateribus et scutello, sordide cinereis; segmentis abdominis cinereo marginatis; halteribus fuscis, clavâ testaceâ; pedibus cinereo pruinosis et albido parçè spinosis, pulvillis testaceis; alis hyalinis, venis fuscis.

Presque glabre, d'un brun noirâtre. Antennes noires ; occiput brun ; face d'un gris obscur, moustache d'un blanc très-légèrement teinté de jaunâtre, barbe et villosité postorbitaire blanches ; thorax, avec les côtés, deux courtes bandes transversales, les sutures, et, de chaque côté, écusson, d'un gris roussâtre ; flancs grisâtres ; abdomen avec le bord postérieur des segments gris ; balanciers bruns, massue testacée ; pieds couverts d'une pulvérulence grise, assez clair-semés de poils et d'épines courts, de couleur blanche, pelotes testacées ; ailes claires, nervures entièrement brunes.

Très-voisin de mon *S. scalare*, mais beaucoup moins villeux ; ressemble au *S. albicapillus* (sic) de M. Van der Wulp., mais diffère par la coloration des ailes.

Tidore. — Ma collection.

Genre GONIOSCELIS (Schiner).

1. G. CALOPUS, ♀. — Long. 15 mill.

Cinereus, pedibus pallidè fulvis : antennis nigris, setis verticis nigris ; thorace vittis quatuor dilutè fuscis ; halteribus pallidè testaceis ; abdomine, incisuris et apice, vitta dorsali, testaceo fulvo ; femoribus anterioribus, infernè, maculâque oblongâ, posticis, vittâ supernè, fuscâ ; vittâ tibiis posticis, spinis inferis anteriorum, tarsis cunctis, apice, nigro fusco ; alis pallidè testaceis, apice cinereis.

D'un gris un peu jaunâtre, pieds d'un fauve pâle : antennes noires, soies de la base et du vertex, noires ; thorax avec quatre bandes assez diffuses, latérales élargies, brunâtres, flancs d'un gris blanc ; balanciers d'un jaune testacé ; écusson brunâtre ; abdomen avec un peu de duvet blanchâtre en dessous, segments bordés d'un jaunâtre obscur, base du 5^e vers son milieu, une bande dorsale sur les 6^e et suivants, organe ♀, d'un testacé brun luisant ; hanches à poils blancs ; pieds d'un jaune fauve, avec des poils blanchâtres sous les cuisses, les cuisses antérieures avec une macule ovale sise extérieurement, les épines en dessous, celles des tibias antérieurs, une bande à la partie supérieure des cuisses postérieures, une autre le long des tibias postérieurs, en dessus, extrémité de tous les tarses, noirâtres, macrochètes testacées ainsi que les pelotes ; ailes jaunâtres.

Natal. — Ma collection.

2. G. MACULIVENTRIS, ♂. — Long. 10 mill.

Cinereo fusco, pedibus fulvis : antennis nigris, basi fulvis ; barbâ fulvâ, mystace ejusdem coloris, setis nigris supernè, setis antennarum, basi, setisque verticis, nigris, facie albidâ, fronte fuscâ ; thorace obscurè fusco quadrivittato, scapulis fulvis, macrochètis nigris ; halteribus pallidè testaceis ; abdomine fulvo rubiginoso, maculis segmentorum, utrinque, basi, nigris ; pedibus fulvis, femoribus anterioribus, extrinsecus, maculâ oblongâ subtilis, spinis, tibiis et spinis inferis, macrochètis, nigris ; alis pallidè fuscis.

. D'un brun grisâtre, pieds fauves : antennes fauves, trois articles basilaires et les soies de la base, noirs ; soies du vertex et de l'occiput noires, barbe,

moustache, roussâtres, celle-ci avec des soies noires en dessus, face blanche, front brun; thorax grisâtre, quatre bandes peu distinctes, brunâtres, semé de macrochètes noirs, épaules fauves; écusson brun, avec des macrochètes noirs; flancs brunâtres; balanciers d'un testacé pâle; abdomen d'un fauve rougeâtre, avec un duvet fin clair-semé, blanchâtre, chaque segment, à la base, de chaque côté, orné d'une large macule lunulée, brune; hanches à poils roussâtres; pieds à duvet jaunâtre, macrochètes assez serrés, une rangée de courtes épines très-serrées, sous les cuisses et sous la base des tibias antérieurs, noires, une tache allongée à la face externe des cuisses antérieures, extrémité de tous les tarses, de nuance brune; ailes brunâtres.

Natal. — Ma collection.

Genre CODULA (Macq., Schiner).

C. QUADRICINCTA, ♂ ? — Long. 12 mill.

Nigro flavoque picta : antennis basi fulvis ; facie nigrâ, utrinque fulvo notatâ et albido marginatâ, mystace flavo, barbâ, ferè nullâ, albidâ ; thorace nigro, scutello fulvo rubiginoso ; halteribus, vittis quatuor abdominalis, flavis, pedibus rubidis, femoribus latè, tibiis anterioribus, apice, tarsisque, nigris ; alis castaneis, maculis longis hyalinis, venis fusco marginatis.

Noire : antennes à base rougeâtre (*le reste manque*); face noire, blanche de chaque côté, deux larges macules latérales rougeâtres, moustache jaunâtre, soies des palpes noires, barbe presque nulle, blanche; abdomen, bords postérieurs des segments 4-5 largement jaunes; pieds rougeâtres, base des cuisses, largement, extrémité des tibias et de tous les tarses, noires, macrochètes testacés; ailes claires, avec deux bandes basilaires longitudinales, une large bande semblable vers l'extrémité, le long du bord externe, une autre sur les nervures transversales, brunes; bords extérieurs et postérieurs, largement, d'un gris foncé.

Les organes copulateurs se trouvant assez profondément cachés, je n'ai pu déterminer positivement le sexe des trois individus que je possède.

Australia. — Ma collection.

Genre CERATURGUS (Wiedm., Schiner).

C. GENICULATUS, ♂. — Long. 9 mill.

Obscurè fuscus : antennis nigris ; facie albidâ, mystace, barbâ et setis palporum, cinereis ; thorace obscurè bivittato, et, retro, utrinque, bima-culato ; abdomine utrinque, segmentis cinereo marginatis ; halteribus, femoribus posticis, tibiis, tarsisque, basi, parum fulvis ; alis fere hyalinis.

D'un noir brunâtre : antennes à base noire (*le reste manque*) ; face blanchâtre, moustache, barbe, soies des palpes, grises ; thorax avec deux bandes peu distinctes, très-rapprochées l'une de l'autre, et deux larges macules trapézoïdales, de chaque côté, en arrière de la suture, brunâtres, flancs gris ; balanciers testacés ; abdomen avec les segments, de chaque côté, finement marginés de gris blanchâtre ; pieds noirâtres, macrochètes blanchâtres, base des cuisses postérieures et de tous les tibias testacée, base du premier article des tarses également un peu fauve, pelotes brunâtres, ailes presque hyalines.

Mexicus. — Ma collection.

Genre DAMALIS (Wiedem., Schiner).

D. SAIGONENSIS, ♀. — Long. 11 mill.

Fuscus, abdomine basi, pedibusque obscurè rubiginosis : antennis et mystace nigris ; facie nigro nitido, supernè castaneâ, barbâ cinereâ ; thorace nitente, scapulis, suturis, lateribus, pleuris et scutello, flavido testaceo micantibus ; halteribus fulvis ; abdomine fusco nitente, pedibus castaneis, femoribus tibiisque posticis, obscurioribus ; alis fere hyalinis, apice fuscis.

D'un noir brunâtre assez luisant : antennes noires ; face d'un noir luisant, châtain foncé vers son milieu, sous les antennes et sur le front, moustache noire, barbe grise, toutes deux très-peu fournies ; thorax assez luisant avec deux bandes, fort élargies en avant et fort écartées l'une de l'autre, la suture, tous les bords, ainsi que les flancs, avec un duvet pulvérulent

jaunâtre, métathorax, écusson, d'un fauve obscur avec des reflets semblables; balanciers jaunes; abdomen assez luisant, d'une couleur brun foncé qui se dégrade de plus en plus et se change, vers la base, en une nuance roussâtre claire; pieds luisants, d'un rougeâtre foncé, cuisses et tibias postérieurs teintés de brun, pelotes brunâtres; ailes presque hyalines, un peu brunâtres extérieurement, à la base; extrémité avec une large macule diffuse, brune.

Saigon. — Ma collection.

Genre LEPTOGASTER Meig. (*Gonypes* Latr.).

1. L. SIMPLEX, ♂. — Long. 15 mill.

Testaceo cinereo : antennis, haustello, palpis et mystace testaceis ; facie albidâ ; thorace testaceo fulvo, lateribus subalbis ; abdomine cinereo, basi et apice parum fulvo ; halteribus testaceis ; pedibus testaceis ; alis pallidissime flavis.

D'un testacé grisâtre : antennes, rostre, palpes et moustache testacés, face blanche, front testacé ; thorax d'un fauve grisâtre en dessus, blanchâtre sur les flancs ; balanciers testacés ; abdomen grisâtre, un peu rougeâtre vers la base ainsi qu'à l'extrémité ; pieds entièrement d'un testacé pâle, les ongles et l'extrémité des macrochètes épineux des tarses, noirs ; ailes presque hyalines, légèrement teintées de jaune.

Ceylan. — Ma collection.

2. L. SCAPULARIS, ♂, ♀. — Long. 14 mill.

♂, ♀. *Nigro fusco, pleuris scapulisque latè rubidis : antennis nigris, basi fulvis ; facie et mystace albidis ; halteribus fuscis ; abdomine, segmentis 2-3^{is} utrinque, apice, obscure fulvis ; pedibus fulvis, femoribus anterioribus et intermediis, intus et apice, tibiis intus, tarsisque obscure castaneis ; posticis, femoribus apice, nigro annulatis, geniculis, tibiis et tarsis apice, nigro castaneo ; alis pallidè fuscis, intus et apice, latè, ferè hyalinis.*

♂, ♀. D'un noir brun : épaules, côtés, flancs et hanches largement rougeâtres ; antennes et rostre noirs, 1^{er} article des antennes rougeâtre ; face

et barbe blanches ; abdomen avec quelques reflets grisâtres sur les côtés, et, latéralement, vers l'extrémité des 2^e et 3^e segments, d'un roussâtre obscur ; balanciers bruns ; pieds d'un fauve rougeâtre ; antérieurs et intermédiaires, cuisses, noirâtres en dedans et en dessus, vers leurs extrémités, tibias avec une bande noirâtre le long de la face interne ; postérieurs, cuisses avec un large anneau vers l'extrémité, genoux, extrémité des tibias, noirâtres, tarses noirâtres avec le 1^{er} article fauve et les épines noirâtres ; les tibias postérieurs sont munis, à leur extrémité, de quelques pointes blanches ; ailes brunâtres, principalement vers le milieu du disque, base hyaline, ainsi que les bords internes, les postérieurs, et l'extrémité.

California. — Ma collection.

3. L. NUBECULOSUS, ♂. — Long. 19 mill.

(*Detritus.*) *Nitens, nigro fusco : antennis et facie fuscis : thorace nitido, scapulis, angulis posticis pleurisque, retrorsum, testaceis ; halteribus testaceis, apice fuscis ; pedibus anterioribus testaceis, femoribus apice, tibiis intus, fuscis ; intermediis, femoribus, tibiis tarsisque, apicè nigris ; alis cinereis, extrinsecus et in medio parum infuscatis.*

(*Détérioré.*) D'un noir luisant : antennes et face brunes ; épaules, angles postérieurs du thorax, fauves ; balanciers testacés (*pièds brisés en partie et détériorés*) ; cuisses et tibias intermédiaires d'un brun noirâtre luisant, pieds antérieurs testacés, cuisses en dessus, à l'extrémité, côté interne des tibias, tarses, l'extrémité du premier segment et les suivants, noirs ; ailes un peu grisâtres, la nuance est plus obscure vers le milieu du disque, principalement au bord externe.

Columbia. — Ma collection.

4. L. ANTIPODUS, ♂. — Long. 17 mill.

Testaceo obscuro : antennis fulvis, apice fuscis ; haustello fulvo, facie cinerea, supernè fuscâ ; thorace fulvo rubiginoso, vittis duabus, maculisque, quatuor, retrorsum, fuscis ; abdomine fulvo testaceo, superne et apice, fuscato ; pleuris cinereis ; pedibus testaceis, geniculis nigris, femoribus posticis fusco biannulatis ; alis palidissimè flavis, apice parum cinereis.

D'un testacé obscur : antennes fauves, brunes à l'extrémité ; face et

moustache blanchâtres, la première brunâtre en dessus; thorax rougeâtre en dessus, sur les flancs et sur les hanches, deux bandes médianes et deux larges macules en arrière, de chaque côté, brunes; balanciers testacés; abdomen brunâtre, avec un peu de fauve en dessus et vers l'extrémité; pieds testacés, genoux, épines des tarsi, noirâtres; cuisses postérieures largement annelées de brun à la base, un second anneau plus étroit, avant l'extrémité, tarsi légèrement brunâtres à l'extrémité des articles; ailes claires, un peu jaunâtres, légèrement grisâtres à l'extrémité.

Van Diemen. — Ma collection.

5. L. FULVIPES, ♂. — Long. 13 mill.

Antennis fuscis, segmento primo fulvido; palpis fuscis; facie cinerea; mystace barbâque pallide cinereis; thorace obscure fulvo, et, retrorsum, utrinque, vittâ abbreviatâ indeterminatâ fuscâ, pleuris cinereis; halteribus testaceis clavâ fuscâ; abdomine testaceo fulvo, basi, segmentorum, maculâ latâ subquadratâ et apice, castaneis; pedibus obscure fulvis; alis, abdomine brevioribus, pallide testaceis, venâ costali infuscatâ.

Antennes brunes, premier segment d'un fauve obscur; palpes bruns; moustache, barbe, rares et courtes, d'un gris blanchâtre; face d'un gris obscur; thorax châtain, en arrière avec deux larges et courtes bandes diffuses, brunes, flancs gris; balanciers testacés, massue brune; abdomen d'un fauve testacé, premier segment, une large macule presque carrée sur l'arceau dorsal des suivants, et l'extrémité, bruns; ailes d'un testacé très-pâle, les nervures costales et sous-costales brunes; pieds d'un testacé fauve, genoux, articulations des tarsi, épines, bruns. Les ailes sont d'un tiers plus courtes que l'abdomen.

Ternate. — Ma collection.

NOTA. Pour l'errata de ce mémoire (*Pars prima*), voir le Bulletin de 1879, n° 2, p. 21.